

1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS
Gastro Pasc®,
Homöopathische Arzneimittel bei Erkrankungen
der Verdauungsorgane

**2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE
ZUSAMMENSETZUNG**

10 g (= 10,3 ml) enthalten:
Arzneilich wirksame Bestandteile:
Argentum nitricum Dil. D6 1,5 g
Belladonna Dil. D4 1,5 g
Hydrastis Dil. D4 1,5 g
Nux vomica Dil. D4 1,5 g
Phosphorus Dil. D6 1,5 g
Die Bestandteile werden über die letzte Stufe
mit Ethanol 15% (m/m) potenziert.

1 g entspricht 30 Tropfen

Dieses Arzneimittel enthält ca. 37 mg
Alkohol (Ethanol) pro 5 Tropfen.

Vollständige Auflistung der sonstigen
Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.

3. DARREICHUNGSFORM

Mischung

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den
homöopathischen Arzneimittelbildern ab.
Dazu gehören: Besserung von Magen-
Darmbeschwerden.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung:
Soweit nicht anders verordnet:
Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:
Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze
Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 5 Tropfen in
Wasser einnehmen.
Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal
täglich je 5 Tropfen in Wasser einnehmen.
Bei Besserung der Beschwerden ist die
Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.
Eine über eine Woche hinausgehende
Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit
einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten
erfolgen.

Art und Dauer der Anwendung:
Auch homöopathische Arzneimittel nicht
über längere Zeit ohne ärztlichen bzw.
medizinischen Rat einsetzen.

4.3 Gegenanzeigen

Gastro Pasc® soll bei Alkoholkranken nicht
angewendet werden sowie bei
Überempfindlichkeit gegen einen der
Wirkstoffe oder gegen einen der in Abschnitt
6.1 genannten sonstigen Bestandteile.

**4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-
maßnahmen für die Anwendung**

Die Menge in 5 Tropfen dieses Arzneimittels
entspricht weniger als 1 ml Bier
oder 1 ml Wein.
Die geringe Alkoholmenge in diesem
Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren
Auswirkungen.

Der Patient liest in der Packungsbeilage: Bei
Schwarzfärbung des Stuhls oder Blut im
Stuhl, sowie bei anhaltenden, unklaren oder
neu auftretenden Beschwerden sollte ein
Arzt aufgesucht werden, da es sich um
Erkrankungen handeln kann, die einer
ärztlichen Abklärung bedürfen.

Kinder:

Zur Anwendung des Arzneimittels bei
Kindern liegen keine ausreichend dokumen-
tierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei
Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet
werden.

**4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-
mitteln und sonstige Wechselwirkungen**

Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines
homöopathischen Arzneimittels kann durch
allgemein schädigende Faktoren in der
Lebensweise und durch Reiz- und
Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine ausreichend dokumentierten
Erfahrungen vorliegen, sollte Gastro Pasc® in
Schwangerschaft und Stillzeit nur nach
Rücksprache mit dem Arzt eingenommen
werden.
Untersuchungen zur Beeinflussung der
Fertilität liegen nicht vor.

**4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-
keit und die Fähigkeit zum Bedienen von
Maschinen**

Keine bekannt, aufgrund der wirksamen
Bestandteile auch nicht zu erwarten.

4.8 Nebenwirkungen

Keine bekannt.
Der Patient liest in der Gebrauchsinformation:
Hinweise: Bei der Einnahme eines homöo-
pathischen Arzneimittels können sich die
vorhandenen Beschwerden vorübergehend
verschlimmern (Erstverschlimmerung). In
diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel
absetzen und Ihren Arzt befragen.

In der Packungsbeilage wird der Patient auf
Folgendes hingewiesen:
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken,
wenden Sie sich an Ihren Arzt oder
Apotheker. Dies gilt auch für
Nebenwirkungen, die nicht in dieser
Packungsbeilage angegeben sind.

**Meldung des Verdachts auf
Nebenwirkungen**

Die Meldung des Verdachts auf
Nebenwirkungen nach der Zulassung ist von
großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine
kontinuierliche Überwachung des Nutzen-
Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels.
Angehörige von Gesundheitsberufen sind
aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer
Nebenwirkung dem Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt.
Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger
Allee 3, D-53175 Bonn, Website:
www.bfarm.de anzuzeigen.

4.9 Überdosierung

Intoxikationen mit Gastro Pasc® sind nicht
bekannt und auch aufgrund der arzneilich
wirksamen Bestandteile nicht zu erwarten.

**5. PHARMAKOLOGISCHE
EIGENSCHAFTEN**

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Entfällt.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Ethanol 15 % (m/m).

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

5 Jahre.
Dieses Arzneimittel soll nach Ablauf des
Verfallsdatums nicht mehr angewendet
werden.

**6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die
Aufbewahrung**

Nicht über 25 °C aufbewahren.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Originalpackungen mit
20 ml (N1)
100 ml (N2)
Es werden möglicherweise nicht alle
Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

**6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die
Beseitigung**

Keine speziellen Angaben.

7. INHABER DER ZULASSUNG

Pascoe
pharmazeutische Präparate GmbH
Schiffenberger Weg 55
D-35394 Giessen
bzw. Großempfängerpostleitzahl
D-35383 Giessen
Telefon +49 (0)641/79 60-0
Telefax +49 (0)641/79 60-1 09
Internet: www.pascoe.de
E-Mail: info@pascoe.de



8. ZULASSUNGSNUMMER

6727883.00.00

**9. DATUM DER VERLÄNGERUNG DER
ZULASSUNG**

26.07.2006

10. STAND DER INFORMATION

09 / 2021

11. VERKAUFSABGRENZUNG

Apothekenpflichtig.